

مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة الأمراض

هيئة الخدمات الصحية الإقليمية

جدري القرود

جدري القرود هو مرض يسببه فيروس جدري القرود. حيث يدخل الجسم من خلال شقوق في الجلد (حتى لو لم يكن مرئيًا) أو المجرى التنفسي أو العينين أو الأنف أو الفم.

الوضع الراهن

منذ مايو/ أيار 2022، تم الإبلاغ عن حالات في كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. على الرغم من حدوث حالات تفشي لعدوى جدري القرود في الماضي، إلا أن الوضع الحالي غير عادي حيث تم الإبلاغ عن عدد أكبر من الحالات في العديد من البلدان في نفس الوقت.

يعد انتشار جدري القرود من شخص لآخر أمرًا غير شائع، ولكن عندما يحدث، فيكون ذلك من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بجدري القرود.

تعمل كولومبيا البريطانية (British Colombia) بشكل وثيق مع شركاء اتحاديين وإقليميين بما في ذلك المختبر الوطني للأحياء الدقيقة ووكالة الصحة العامة الكندية. وتتابع الصحة العامة المحلية مع جميع المخالطين المعروفين للحالات.

كيف ينتقل

يمكن أن ينتقل جدري القرود من الحيوانات إلى البشر ومن شخص لآخر ومن خلال الأشياء الملوثة.

- ينتقل جدري القرود من خلال ملامسة القروح ومواد مثل الفراش أو المناشف التي تحتوي على فيروس جدري القرود. ويمكن أن ينتشر أيضًا من خلال قطرات الجهاز التنفسي مثلا عند السعال والعطاس أثناء الاتصال الوثيق وجهاً لوجه مع شخص مصاب بجدري القرود.
- من غير المعروف أن جدري القرود ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وهذا يعني أن الفيروس لا ينتشر عن طريق السائل المنوي أو سوائل المهبل أو المستقيم وليس عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI). يمكن أن ينتشر من خلال الاتصال الوثيق أثناء النشاط الجنسى.

الأعراض

يمكن أن تدوم الأعراض من إسبوعين إلى أربعة أسابيع وتحدث على مرحلتين.

يمكن أن تشمل المرحلة الأولى أعراض:

• الحُمي



- قشعريرة
- صداع شدید
- تورم الغدد الليمفاوية
 - ألم في الظهر
 - ألم في العضلات
 - التعب أو الإر هاق
- يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا التهاب الحلق والسعال والغثيان أو التقيؤ والإسهال تبدأ المرحلة الثانية عادة من يوم إلى خمسة أيام بعد المرحلة الأولى.

يمكن أن تشمل المرحلة الثانية الأعراض:

- طفح جلدي غالبًا ما يبدأ على الوجه أو الساقين والذراعين، ويمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، مثل البدين والقدمين والفم والأعضاء التناسلية.
- تستمر تقرحات جدري القرود عادة ما بين أسبو عين إلى ثلاثة أسابيع. وتتغير القروح في المظهر بمرور الوقت لتشكل بقع بارزة إلى بثور صغيرة مملوءة بالسوائل. وتشكل في النهاية قشورًا ومن ثم تسقط.

ويختلف الناس في معاناتهم من الأعراض بشكل مختلف. على سبيل المثال، قد لا يعانون من أعراض المرحلة الأولى ولكنهم سيصابون بالقروح، وقد يصابون بتقرحات في جزء واحد فقط أو أجزاء قليلة من الجسم.

إذا كنت قد تعرضت للفايروس

- الصحة العامة تتابع جميع المخالطين المعروفين للحالات.
- راقب الأعراض إذا كنت قد اختلطت بشخص معروف أو مشتبه أنه مصاب بجدري القردة.
- قد يستغرق الأمر من أسبوع واحد إلى ثلاثة أسابيع بعد التعرض حتى تظهر الأعراض على الشخص.

إذا مرضت

- اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لإجراء الفحص. أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قد اتصلت بشخص معروف أو مشتبه أنه مصاب بجدري القردة.
 - ابق في المنزل واعزل نفسك حتى ترى مقدم الرعاية الصحية.
 - ٥ ابتعد عن الأشخاص الذين تعيش معهم إذا استطعت ولا تشاركهم المناشف أو الملابس أو البياضات.
- و إذا أمكن، اطلب من الأشخاص الذين يعيشون معك أو عائلتك أو أصدقائك الآخرين رعاية أي حيوانات أليفة
 حتى لا تنقل جدري القرود إلى الحيوانات.
 - إذا تم تأكيد الإصابة بجدري القرود، فسوف تتصل بك الصحة العامة لإعطائك المزيد من التعليمات.
 - يعتبر جدرى القرود عادة مرضًا خفيفًا ويتعافى معظم الناس من تلقاء أنفسهم بعد بضعة أسابيع.



• لا توجد علاجات راسخة لجدري القرود. يمكن النظر في الأخذ بالأدوية المضادة للفيروسات على أساس كل حالة على حدة.

الوقاية والتطعيم

- تحتفظ وزارة الصحة الكندية بمخزون محدود من لقاح جدري القرود (TM Imvamune) الذي سيتاح لسلطات الصحة العامة في المقاطعات والأقاليم في حالة وجود حالات إصابة بجدري القرود. لكنه ليس متاحًا حاليا لعامة الناس.
 - المناقشات جارية في كندا لتحديد أفضل السبل لاستخدام اللقاح للمساعدة في السيطرة على العدوى.
 - لا حاجة لبرنامج تحصين شامل في هذا الوقت.