



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

세프트리아kson Ceftriaxone

세프트리아kson은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 근육에 주사로 투여하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 세프트리아kson이나 세팔로스포르린(cephalosporin)계 항생제(예: 세픽심(cefixime)(Suprax[®]), 세팔렉신(cephalexin)(Keflex[®]), 세파클로르(cefactor)(Ceclor[®]), 페니실린계 항생제(예: 페니실린 V-K, 아목시실린(amoxicillin)(Amoxil[®]), 리도카인(lidocaine), 기타 국소 마취제, 아마이드(amide)계 약물(예: 프릴로카인(prilocaine), 멕실레틴(mexiletine), 아미오다론(amiodarone))에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오. 리도카인은 세프트리아kson과 혼합하여 주사 부위의 통증을 줄여줍니다.

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

세프트리아kson은 임신과 수유 기간에 주의하여 사용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- 쓸개, 간, 콩팥, 췌장, 출혈 장애가 있거나 위 기능 장애, 특히 대장염 병력이 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.
- 다음 약을 세프트리아kson과 함께 사용하지 마십시오.
 - 경구 장티푸스 백신(Vivotif[®])
- 세프트리아kson은 특정 요당 검사에 방해가 될 수 있습니다. (Clinitest[®])

세프트리악손 Ceftriaxone

- 세프트리악손은 미숙아나 혈중 빌리루빈 수치가 높은 생후 1개월 미만 젖먹이에게 사용이 금지되어 있습니다.
- **약물 상호 작용:** 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

부작용(Side Effects)

- 주사 부위에 불편감이나 빨개짐, 부기가 있을 수 있습니다.
- 설사를 하실 수도 있습니다.
- 이 중 어느 부작용이든 지속하거나 악화하면 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.

치료 후 관리(Care Following Treatment)

- 주사 후 클리닉에서 15분간 기다리십시오.
- 치료 후 어떤 반응이든 나타나면(예: 발진, 가려움, 호흡 곤란) 직원에게 즉시 알려주시기 바랍니다.
- 클리닉을 떠나신 후 이런 증상이 발생하면 즉시 응급 의료를 받으십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
 - 세프트리악손 치료 완료 후 1주일 또는 다음 시점까지
 - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너(들) 역시 치료를 받았음
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 www.smartsexresource.com 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다.