



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

氯法齐明 CLOFAZIMINE

氯法齐明(Clofazimine)是一种用于治疗结核病(TB)、麻风病和其它相关传染病的抗生素。

我该什么时候服用此药物 (When should I take this) ?

- 与食物或牛奶一起服用，有助于吸收并减少肠胃不适。
- 每天同一时间服用此药物。这将帮助您记得服药。

我该如何服用此药物 (How should I take this) ?

- 定期服用氯法齐明非常重要。
- 遵医嘱服用。

如果漏服一次，我该怎么做 (What should I do if I miss a dose) ?

- 如果您漏服一次，想起时应尽快服药。但是如果快到第二天的服药时间，则不必补服。
- 请勿服用双倍剂量。

如果您正在服用任何其他药物，包括不需处方可以出售的（非处方）药物，请告知您的医生、护士和药剂师。

在服药期间，避免过度暴露于阳光或紫外线（如太阳灯或晒黑床）。氯法齐明可以使您对阳光更敏感。请使用防晒霜以及穿防护服。

有什么可能的副作用 (What are some possible side effects) ?

- 恶心、呕吐和腹泻
- 头晕或嗜睡
- 皮肤干燥或眼睛干涩
- 发痒

氯法齐明（续） CLOFAZIMINE (cont'd)

警告(Caution): 如果您出现以下症状, 请立即致电医生或护士:

- 异常疲劳或虚弱
- 持续恶心或呕吐
- 皮肤或眼睛发黄 (可能是橙色, 假如之前已有红色或褐黑色的变色现象)
- 严重腹痛或胃痛
- 鲜红色或黑焦油状大便
- 昏厥或心律不齐
- 皮疹

如果您出现任何本信息表上未提及的异常症状, 请告知医生。

此药物可能会造成流泪、流口水、出汗、小便、大便以及眼睑内呈**红色或棕黑色**, 还可能造成皮肤颜色变为红褐色, 像是被太阳晒后的颜色。这些是无害的, 而且可逆转, 但在治疗后可能会经过一段时间才能复原。

关于服用氯法齐明, 我还需要知道什么 (What else do I need to know about taking clofazimine) ?

- 如果您已**怀孕**、计划怀孕或您想用**母乳喂养**孩子, 请告知医生或护士。
- 如果您佩戴软性隐形眼镜, 请告知医生或护士。

此药物应如何存放 (Where should I store this medication) ?

- 谨防儿童接触。
- 避光。
- 胶囊: 置于盖紧的容器内, 放在凉爽、干燥处, 室温保存。

如果我有其他问题, 应该致电给谁 (Where do I call if I have any other questions) ?

您的医生、诊所或公共卫生单位: _____
温哥华结核病服务诊所: 604-707-2692
新西敏市结核病服务诊所: 604-707-2698
BC省疾病控制中心疫苗与药房服务: 604-707-2580