

## ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ

### Ceftriaxone

ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਣ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਜ਼) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

#### ਐਲਰਜੀਆਂ (Allergies)

- ਅਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ, ਹੋਰ ਸੈਫਲੋਸਪੋਰੀਨ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਫਿਕਸੀਮ (Suprax® - ਸੂਪਰੈਕਸ), ਸੈਫਲਾਕਸੀਨ (ਕੀਫਲੈਕਸ). ਸੀਫੈਕਟਰ (ਸੈਕਲੋਰ), ਜਾਂ ਪੈਨਸਿਲੀਨ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲੀਨ V-K,, ਐਮੈਕਸੀਲੀਨ (ਐਮੈਕਸਿਲ) ਜਾਂ ਲਿਡਕੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਮਿਡ ਟਾਈਪ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲੋਕੇਨ, ਮੈਕਸੀਲੇਟਿਨ, ਐਮੀਓਡਰੋਨ) ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਲਿਡਕੇਨ ਨੂੰ ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਸਕੋਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

#### ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

#### ਸਾਵਧਾਨੀ (CAUTION)

- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਤੇ (ਗੱਲ-ਬਲੈਡਰ), ਗੁਰਦੇ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾਈਟਿਸ (ਵੱਡੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼) ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਵੋ:
  - ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ (Vivotif® - ਵੀਵੋਟਿਫ)
- ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਕਲੀਨੀਟੈਸਟ - Clinitest®)
- ਗਰਭਕਾਲ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ “ਬਿਲੌਬੁਬਿਨ” ਦੀ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
- ਚੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਹਰਬਲ, ਜਾਂ ਮਨ-ਪਰਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

## ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ (ਜਾਰੀ) **Ceftriaxone (cont'd)**

### ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Side Effects)

- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜਿਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਧੱਢੇ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

### ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (Care Following Treatment)

- ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੱਡੇ, ਖਾਜ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ) ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Special Instructions)

- ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ:
  - ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਫਟ੍ਰਾਇਐਕਸੋਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ; **ਅਤੇ**
  - ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀ(ਅਂ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਹੁੰ-ਪੱਖੀ (ਨੈਗੋਟਿਵ) ਹੀ ਹੋਣ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।