



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

604.707.2443
604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

아지트로마이신 **Azithromycin**

아지트로마이신은 특정 성 매개 감염(STI) 치료용으로 복용하는 항생제입니다.

알레르기(Allergies)

- 마크로라이드(macrolide)계 항생제(예: 아지트로마이신(Z-pak[®], Zithromax[®]), 에리트로마이신(erythromycin), 클래리트로마이신(Clarithromycin)(Biaxin[®]))에 알레르기가 있으시면 의료 제공자에게 알려주십시오.

임신과 수유(Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- 아지트로마이신은 임신과 수유 기간에 주의하여 사용하셔도 됩니다. 의료 제공자와 상담하시기 바랍니다.

주의 사항(CAUTION)

- 알루미늄 및/또는 마그네슘이 함유된 제산제를 아지트로마이신과 동시에 복용하지 마십시오. 두 시간 이상 간격을 두십시오.
- 기존 심장 질환이나 부정맥, 전해질 장애(예: 느린맥박, QT 간격 연장, 저칼륨 혈증, 저마그네슘 혈증)가 있으시면 의료 제공자에게 알려주시기 바랍니다.
- 아지트로마이신을 복용하시는 동안에는 다음 약을 복용하지 마십시오.
 - 정신병 치료제: 피모자이드(pimozide)(Orap[®]), 지프라시돈(ziprasidone)(Zeldox[®])
 - 항바이러스: 사퀴나비르(saquinavir)(Invirase[®])
 - 심장: 드로네다론(dronedarone)(Multaq[®])
 - 편두통: 디히드로에르고타민(dihydroergotamine)(Migranal[®])
- 약물 상호 작용: 개개의 약물 상호 작용이 이 문서에 더는 기재되지 않음을 알려드립니다. 처방 약이나 비처방 약, 생약, 레크리에이션 제품을 복용 중이시면 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

아지트로마이신 Azithromycin

부작용(Side Effects)

- 설사나 메스꺼움, 복통, 구토가 있을 수 있습니다.

복용 방법(Instructions for Taking)

- 아지트로마이신은 음식과 함께 또는 빈속에 복용하셔도 됩니다.
- 의료 제공자가 지시하는 용량을 따르십시오.

보관 방법(Storage Instructions)

- 15~30°C의 상온에 보관하십시오.
- 빛, 열, 습기로부터 보호하십시오.
- 표시된 유효 기간이 지난 약은 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

특별 주의 사항(Special Instructions)

- 다음 시점까지 성관계를 갖지 마십시오.
 - 치료 완료 후 1주일 또는 의료 제공자가 권고한 기간 및
 - 검사 결과가 음성이어도 성관계 파트너 역시 치료를 받았고 또한 성관계 파트너의 치료가 시작된 이후 1주일이 경과함
- 치료를 받지 않은 파트너와 성관계를 하시는 경우 또는 본인이나 파트너의 치료가 완료되기 전에 성관계를 하시는 경우 재치료를 받으셔야 합니다. 의료 제공자와 상의하시기 바랍니다.

궁금한 점이 있거나 정보가 더 필요하시면 <http://www.smartsexresource.com> 을 보시거나 의료 제공자에게 연락하시기 바랍니다