



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

头孢克肟 Cefixime

头孢克肟 (Suprax®) 是用于治疗某些性传播感染疾病的口服抗生素。

过敏(Allergies)

- 如果您对青霉素类抗生素如青霉素 V-K、阿莫西林 (Amoxil®)或头孢菌素类抗生素如头孢克肟(Suprax®)、头孢氨苄 (Keflex®)、头孢克洛 (Ceclor®)、头孢曲松 (Rocephin®)或其他同类药物过敏，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breastfeeding)

- 怀孕和哺乳期间可谨慎使用头孢克肟。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- 口服最后一剂头孢克肟和口服伤寒疫苗 (Vivotif®) 之间，需间隔 24 小时或以上。
- **药物相互作用：** 请注意，本文件不再列出个别药物的相互作用。如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请与医务人员讨论。
-

副作用 (Side effects)

- 您可能会出现头痛、腹泻、恶心、腹痛和/或胀气。
- 如果您有以下过敏反应症状，请立即挂急诊：荨麻疹，呼吸困难，脸、嘴唇、舌头和喉咙肿胀。

服药说明 (Instructions for Taking)

- 头孢克肟通常按照一次性单剂量开处方。请遵循医务人员的剂量指示。
- 饭后服药，减少胃部不适的发生机率。

头孢克肟（续） Cefixime (cont'd)

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

特殊说明 (Special Instructions)

- 在未满足下列条件之前，不要进行性生活：
 - 为期 1 天的治疗结束后已满一周；**并且**
 - 您的性伴侣也接受了治疗，**而且**自治疗开始后已经过了一周，即使他们的检测结果为阴性亦需治疗。
- 如果您与未经治疗的伴侣发生性关系，或是在您或伴侣的治疗完成之前发生性行为，则需重新治疗。请与医务人员讨论。

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。