



**BC Centre for Disease Control**  
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue  
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443  
Fax 604.707.2441

[www.bccdc.ca](http://www.bccdc.ca)

Clinical Prevention Services –  
STI Control:

604.707.5600  
604.707.5604

[www.SmartSexResource.com](http://www.SmartSexResource.com)

## Ceftriaxona Ceftriaxone

La ceftriaxona es un antibiótico que se administra mediante una inyección intramuscular para el tratamiento de ciertas infecciones de transmisión sexual (ITS).

### Alergias (Allergies)

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a la ceftriaxona, a otro antibiótico a base de cefalosporina, como la cefixima (Suprax®), la cefalexina (Keflex®) o el cefaclor (Ceclor®), a algún antibiótico a base de penicilina, como la penicilina V-K, a la amoxicilina (Amoxil®), o a la lidocaína u otros fármacos o anestésicos locales del grupo de las amidas (p. ej., prilocaína, mexiletina, amiodarona). La ceftriaxona se mezcla con lidocaína para reducir el dolor en el sitio de la inyección.

### Embarazo y lactancia (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

La ceftriaxona puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Consulte a su proveedor de atención médica.

### ADVERTENCIA (CAUTION)

- **Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún trastorno de la vesícula, del hígado, de los riñones, del páncreas, o algún trastorno de sangrado, o bien, si tiene antecedentes de disfunción estomacal, particularmente colitis.**
- **No tome los siguientes medicamentos con ceftriaxona:**
  - **Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif®).**
- **La ceftriaxona puede interferir con ciertas pruebas de glucosa en orina (Clinitest®).**
- **La ceftriaxona está contraindicada en recién nacidos prematuros o en bebés menores de un mes con altos niveles de bilirrubina en la sangre.**
- **Interacciones medicamentosas:** tenga en cuenta que este documento ya no incluye las interacciones medicamentosas individuales. Hable con su proveedor de atención médica si toma algún producto recetado, de venta libre, a base de hierbas o recreativo.

### Efectos secundarios (Side Effects)

- Es posible que sufra de molestia, enrojecimiento o inflamación en el sitio de la inyección.
- Podría presentar salpullido o diarrea.
- Si alguno de estos efectos persiste o empeora, comuníquese con su proveedor de atención médica.

## Ceftriaxona (continuación) Ceftriaxone (cont'd)

### Atención después del tratamiento (Care Following Treatment)

- Espere en la clínica 15 minutos después de la inyección.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (p. ej., salpullido, comezón, dificultad para respirar), infórmese de inmediato a un miembro del personal.
- Si estos síntomas ocurren después de abandonar la clínica, busque ayuda médica urgente de inmediato.

### Instrucciones especiales (Special Instructions)

- No tenga relaciones sexuales:
  - Hasta una semana después de terminar su tratamiento con ceftriaxona; o
  - Hasta que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque los resultados de su prueba sean negativos.
- Tendrá que volver a recibir tratamiento si tiene relaciones sexuales con una pareja que no ha recibido tratamiento, o si tiene relaciones sexuales antes de que el periodo de tratamiento suyo o de su pareja haya terminado. Consulte a su proveedor de atención médica.

Si tiene alguna pregunta o si necesita información adicional, visite [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) o comuníquese con su proveedor de atención médica.