



**BC Centre for Disease Control**  
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue  
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443  
Fax 604.707.2441

[www.bccdc.ca](http://www.bccdc.ca)

Clinical Prevention Services –  
STI Control:

604.707.5600  
604.707.5604

[www.SmartSexResource.com](http://www.SmartSexResource.com)

## セフトリアキソン Ceftriaxone

セフトリアキソンは、特定の性感染症（STI）の治療のために筋肉注射で投与する抗生物質です。

### アレルギー（Allergies）

- セフトリアキソン、セフィキシム（Suprax®）、セファレキシン（Keflex®）、セファクロル（Ceclor®）などのセファロスポリン系抗生物質、またはペニシリン VK、アモキシシリン（Amoxil®）などのペニシリン系抗生物質、またはリドカインなどの局所麻酔薬、またはアミド型麻酔薬（プリロカイン、メキシレチン、アミオダロンなど）の摂取でアレルギー反応が起きたことがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。リドカインは、注射部位の痛みを軽減するためにセフトリアキソンと混合されています。

### 妊娠および授乳（Pregnancy and Breastfeeding）

- セフトリアキソンは、妊娠中および授乳中に慎重に注意して使用することができます。ご自身の医療提供者に相談してください。

### 注意（CAUTION）

- 胆嚢、肝臓、腎臓、脾臓、出血性疾患、または胃腸の機能不全、特に大腸炎の病歴がある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- セフトリアキソンは、以下の薬剤と併用しないでください。
  - 経口腸チフスワクチン（Vivotif®）
- セフトリアキソンは、特定の尿中ブドウ糖検査（Clinitest®）の結果に影響を与えることがあります。

## セフトリアキソン（続き） Ceftriaxone (cont'd)

- 早生児または生後一か月未満で血中ビリルビン濃度が高い乳児へのセフトリアキソンの使用は禁忌です。
- **薬物相互作用**：個々の薬物の相互作用は、この文書には記載されなくなったことにご注意ください。処方薬、非処方薬、ハーブ、またはレクリエーション薬物を服用している場合は、ご自身の医療提供者に相談してください。

### 副作用（Side Effects）

- 注射部位に不快感、発赤、または腫れが起こることがあります。
- 皮膚の発疹または下痢が起こるかもしれません。
- このような副作用が継続または悪化する場合は、ご自身の医療提供者に連絡してください。

### 治療後のケア（Care Following Treatment）

- 注射後 15 分間はクリニックで待機してください。
- 治療後に反応が出た場合（発疹、痒み、呼吸困難など）は、スタッフにすぐに知らせてください。
- クリニックを出た後でこうした反応が出た場合は、直ちに緊急医療に助けを求めてください。

### 特別な指示（Special Instructions）

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
  - セフトリアキソンでの治療完了から一週間が経過した時点、または
  - あなたのパートナー（たち）が治療完了から一週間が経過した時点まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

## セフトリアキソン（続き） Ceftriaxone (cont'd)

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、[www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。