



Korean

목시플록사신
MOXIFLOXACIN

목시플록사신은 결핵(TB)을 비롯한 세균성 감염 치료에 사용하는 항생제입니다.

언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 목시플록사신은 음식과 함께 또는 공복에 복용하셔도 됩니다.
- 8온스(=240mL) 물 한 잔을 전부 마시면서 복용하십시오.
- 알약을 그대로 삼키고 으깨거나 씹지 마십시오.
- 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하는 데 도움이 됩니다.
- 음료를 온종일 여러 잔 섭취하십시오.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 목시플록사신은 의사가 지시한 그대로 복용하는 것이 매우 중요합니다.

약 복용을 걸렀으면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 약 복용을 거르셨으면 생각나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 날 복용 시간이 거의 다 됐으면 그냥 거르십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

복용 시 피해야 할 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 목시플록사신은 다음 약물을 복용하기 최소한 4시간 전 또는 복용 후 8시간이 지난 후에 복용하셔야 합니다.
 - 알루미늄 및/또는 마그네슘 함유 제산제 (마록스(Maalox), 미란타(Mylanta))
 - 수크랄페이트(Sucralfate, 궤양약)
 - 철분 또는 아연 함유 보조제

목시플록사신 복용 전, 현재 복용 중이신 모든 약(비처방약 포함)을 의사나 간호사, 약사에게 반드시 알려주십시오. 새 약은 의사나 약사와 상의 없이 복용을 시작하지 마십시오.

어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects?)

다음과 같은 부작용이 드물게 있을 수 있으나 있어도 대개 경미한 편입니다.

- 메스꺼움, 구토, 설사
- 두통
- 현기증 또는 약간 어지러움

목시플록사신 MOXIFLOXACIN

주의 (Caution): 다음 증상이 있으시면 의사나 간호사에게 즉시 연락하십시오.

- 발진이나 두드러기, 호흡 곤란
- 불규칙한 심장 박동 또는 가슴 통증
- 근육통이나 힘줄의 통증, 관절통
- 손이나 발의 통증, 화끈거림, 저림, 무감각, 쇠약
- 피부 또는 눈 흰자위가 노래짐
- 시력의 변화 또는 장애
- 심한 설사 또는 피 섞인 설사
- 기타 모든 지속성 부작용

이 안내지에서 언급하지 않은 비정상적인 증상이 나타나면 담당 의사에게 알려주세요.

목시플록사신은 졸음이나 현기증을 유발하기도 합니다. 경각 상태나 신체 협응이 필요한 운전이나 기계 조작, 위험 활동 수행 시 주의하십시오.

목시플록사신을 복용하면 피부가 햇빛에 쉽게 탈 수 있습니다. 햇빛이나 인공 자외선(태닝 베드, 태양등 등)에 과도하게 노출되지 않게 하십시오. 자외선 차단제를 바르거나 피부를 보호하는 옷을 입으십시오.

당뇨병이 있는 분은 이 약을 복용하시는 동안 혈당을 정기적으로 재십시오.

임신하셨거나, 임신을 계획하고 있거나, 아기에게 모유를 먹이고 싶으신 분은 의사에게 말씀하십시오.

이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 정제: 밀폐된 용기에 넣어 실온(15°C ~ 30°C)에 보관하십시오. 햇빛으로부터 보호하십시오. 선선하고 건조한 곳에 보관하십시오.

기타 궁금한 점이 있으면 어디에 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사나 클리닉 또는 보건소: _____

밴쿠버 TB 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 TB 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신 약국 서비스: 604-707-2580