



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

피라지나마이드 PYRAZINAMIDE

피라지나마이드는 결핵(TB) 치료에만 사용하는 항생제입니다.

언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 약을 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하는 데 도움이 됩니다.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 규칙적 복용이 매우 중요합니다.
- 의사의 지시대로 복용하십시오.

약 복용을 걸렀으면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 약 복용을 거르셨으면 생각나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음 날 복용 시간이 거의 다 됐으면 그냥 거르십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

복용 시 피해야 할 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 알코올
- 이 약을 복용하는 동안 햇빛이나 인공 자외선(UV)선(예: 태양등이나 태닝 베드)에 과도하게 노출되지 않게 하십시오. 자외선 차단제를 바르고 피부를 보호하는 옷을 입으십시오.

비처방 제품을 포함하여 다른 약을 복용 중이시면 의사나 약사에게 알려주십시오.

이 약을 복용하는 동안 햇빛이나 인공 자외선(UV)선(태닝 베드, 태양등 등)에 과도하게 노출되지 않게 하십시오. 자외선 차단제를 바르고 피부를 보호하는 옷을 입으십시오.

어떤 부작용이 있을 수 있나요? (What are some possible side effects?)

- 관절의 통증 또는 부기

주의 (Caution): 다음 증상이 있으시면 의사나 간호사에게 즉시 연락하십시오.

- 평소와 달리 피곤하거나 힘이 없음
- 발열
- 식욕 상실
- 구역(토하고 싶은 충동)
- 배앓이 또는 설사
- 짙은 소변
- 피부나 눈이 노랗게
- 가려움 또는 피부 발진

피라지나미드(계속) PYRAZINAMIDE (cont'd)

이 안내지에서 언급하지 않은 비정상적인 증상이 나타나면 담당 의사에게 알려주세요.

피라지나미드 복용에 관하여 알아두어야 할 기타 사항은 무엇인가요? (What else do I need to know about taking Pyrazinamide?)

- 의사가 지시한 모든 검사실 검사를 받고 의사나 간호사 방문 예약을 빠짐없이 지키는 것이 중요합니다.
- 다음 상태가 해당하는 경우 의사에게 말씀하십시오: 급성 통풍, 간 질환, 잦은 음주
- 임신하셨거나, 임신을 계획하고 있거나, 아기에게 모유 수유를 원하는 분은 의사에게 말씀하십시오.

이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선이 닿지 않게 하십시오.
- 상온의 선선하고 건조한 곳에 보관하십시오.

기타 궁금한 점이 있으면 어디에 전화하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사나 클리닉 또는 보건소: _____

밴쿠버 TB 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 TB 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신 약국 서비스: 604-707-2580