



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

阿昔洛韦和伐昔洛韦

Acyclovir and Valacyclovir

阿昔洛韦(Zovirax®)和伐昔洛韦 (Valtrex®)是口服抗病毒药物，用于缩短口腔疱疹（“冷疮”）或生殖器疱疹爆发的持续时间并减轻不适。

过敏(Allergies)

- 若您对任何**抗病毒**药物过敏，如阿昔洛韦(Zovirax®)、泛昔洛韦 (Famvir®) 或伐昔洛韦 (Valtrex®)，请告知医务人员。

怀孕/哺乳 (Pregnancy and Breastfeeding)

- 怀孕和哺乳期间可谨慎使用阿昔洛韦和伐昔洛韦。请咨询医务人员。

警告 (CAUTION)

- **药物相互作用：**如果您在服用任何处方药、非处方药、草药或消遣娱乐产品，请告知医务人员。本文件未一一列出各种药物的相互作用。
- **服用阿昔洛韦或伐昔洛韦期间不要使用以下药物：**
 - 水痘疫苗 (Varilrix®, Varivax®)
 - 带状疱疹疫苗 (Zostavax®)
 - 麻疹、腮腺炎、风疹、水痘疫苗 (Priorix®-Tetra、ProQuad®)

副作用 (Side effects)

- 您可能会出现腹泻、恶心、腹痛、呕吐、头痛、头晕或晕眩。

服药说明 (Instructions for Taking)

- 饭前饭后均可服用阿昔洛韦和伐昔洛韦。
- 饭后服用可减少胃部不适的发生机率。
- 用一整杯水吞服。
- 如果漏服一剂，请在想起来后尽快服用，但如果服用下一剂的时间快到了，则跳过漏服的一剂，继续按平时的服药时间服用。不要服双倍剂量。

阿昔洛韦和伐昔洛韦（续） Acyclovir and Valacyclovir (cont'd)

贮存说明 (Storage Instructions)

- 贮存于 15-30°C 室温下。
- 避光、防高温、防潮。
- 药物超出印明的失效日期，切勿使用。
- 谨防儿童接触。

推荐资源 (Recommended Resources)

- [疱疹：病人宣传材料](#)；4 页，基本信息
- [疱疹：病人指南](#)；25 页，更详细的信息

如果您有疑问或需要更多信息，
请访问 www.smartsexresource.com 或联系医务人员。