



BC Centre for Disease Control  
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services  
Provincial STI/HIV Clinic

655, 12<sup>e</sup> avenue ouest  
Vancouver, C.-B. V5Z 4R4

Tél : 604-707-5600  
Télééc. : 604-707-5604

www.bccdc.ca  
www.SmartSexResource.com

## Céfixime Cefixime

La céfixime (Suprax<sup>MD</sup>) est un antibiotique administré par voie orale pour traiter certaines infections transmissibles sexuellement (ITS).

### Allergies (Allergies)

- Veuillez informer votre fournisseur de soins de santé si vous avez une allergie aux antibiotiques du groupe de pénicilline tels que la pénicilline V-K, l'amoxicilline (Amoxil<sup>MD</sup>), ou tout autre antibiotique dérivé de céphalosporine tel que la céfixime (Suprax<sup>MD</sup>), la céphalexine (Keflex<sup>MD</sup>), le céfaclor (Ceclor<sup>MD</sup>), la ceftriaxone (Rocephin<sup>MD</sup>) ou autres dans cette catégorie de médicaments.

### Grossesse et allaitement (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- La céfixime doit être utilisée avec prudence au cours de la grossesse et de l'allaitement. Veuillez consulter votre fournisseur de soins de santé.

### MISES EN GARDE (CAUTION)

- Laissez s'écouler un délai de 24 heures ou plus entre l'administration de la dernière dose de céfixime et du vaccin oral contre la typhoïde (Vivotif<sup>MD</sup>).
- **Interactions médicamenteuses** : Veuillez noter que les interactions médicamenteuses spécifiques ne sont désormais plus mentionnées dans ce document. Si vous prenez des produits sur ordonnance, en vente libre, à base de plantes ou récréatifs, veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

### Effets secondaires (Side Effects)

- Vous pouvez avoir des maux de tête, des diarrhées, des nausées, des douleurs abdominales ou des flatulences.
- Obtenez immédiatement un avis médical si vous avez les signes suivants d'une réaction allergique : urticaire, difficultés à respirer, gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge.

## Céfixime (suite) Cefixime (cont'd)

### Instructions pour la prise (Instructions for Taking)

- La céfixime est en général prescrite sous forme d'une seule dose à prise unique. Suivez la posologie recommandée par votre fournisseur de soins de santé.
- Prenez ce médicament avec de la nourriture pour réduire le risque de maux d'estomac.

### Instructions de conservation (Storage Instructions)

- Conservez ce médicament à la température ambiante entre 15 et 30 °C.
- Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
- N'utilisez pas ce médicament au-delà de la date de péremption imprimée.
- Ne le laissez pas à la portée des enfants.

### Instructions spéciales (Special Instructions)

- N'ayez pas de relations sexuelles :
  - pendant une semaine après votre traitement d'une journée; **et**
  - tant que vos partenaires sexuels n'ont pas également été traités **et** qu'une semaine s'est écoulée depuis le début de leur traitement, même si les résultats de leurs tests sont négatifs.
- Vous devrez suivre un nouveau traitement si vous avez des relations sexuelles avec un partenaire qui n'a pas été traité ou si vous avez des rapports avant même que toutes les parties concernées aient terminées leurs traitements. Veuillez en discuter avec votre fournisseur de soins de santé.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus d'informations, consultez [www.smartsexresource.com](http://www.smartsexresource.com) ou contactez votre fournisseur de soins de santé.