



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

Tel 604.707.2443
Fax 604.707.2441

www.bccdc.ca

Clinical Prevention Services –
STI Control:

604.707.5600
604.707.5604

www.SmartSexResource.com

セフィキシム Cefixime

セフィキシム(Suprax[®])は、特定の性感染症 (STI)の治療のために経口で服用する抗生物質です。

アレルギー (Allergies)

- ペニシリン VK、アモキシシリン (Amoxil[®]) などのペニシリン系抗生物質、またはセフィキシム (Suprax[®])、セファレキシン (Keflex[®])、セファクロル (Ceclor[®])、セフトリアキソン (Rocephin[®]) などのセファロスポリン系抗生物質、またはこれと同じ薬物クラスの他の薬剤の摂取でアレルギー反応が起きたことがある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。

妊娠および授乳 (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- セフィキシムは、妊娠中および授乳中に慎重に注意して使用することができます。ご自身の医療提供者に相談してください。

注意 (CAUTION)

- セフィキシムの最終服用と経口生腸チフスワクチン (Vivotif[®]) の服用の間は、24 時間以上あけてください。
- 薬物相互作用：**個々の薬物の相互作用は、この文書には記載されなかったことにご注意ください。処方薬、非処方薬、ハーブ、またはレクリエーション薬物を服用している場合は、医療提供者に相談してください。

副作用 (Side Effects)

- 頭痛、下痢、吐き気、腹痛、および／または腸内ガスの発生が起きることがあります。

セフィキシム（続き） Cefixime (cont'd)

- 次のアレルギー反応が出た場合は、すぐに緊急医療に助けを求めてください：発疹、呼吸困難、顔面顔面・唇・舌・喉の腫れ。

服用上の注意 (Instructions for Taking)

- セフィキシムは通常、単回投与で処方されます。ご自身の医療提供者の 処方指示に従ってください。
- セフィキシムは、胃もたれを防ぐために食物と一緒に服用してください。

保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30°C の室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

特別な指示 (Special Instructions)

- 以下の時期まで性行為を避けてください。
 - あなたご自身の一回治療の 一週間後、かつ、
 - あなたのパートナー（たち）も治療を受け、かつ、治療開始から一週間が経過した時点まで。これはパートナー（たち）の検査結果が陰性であった場合も同様です。
- 未治療のパートナーと性行為を行った場合、または、あなたご自身またはパートナー（たち）が治療完了前に性行為を行った場合、あなたには再治療が必要になります。ご自身の医療提供者にご相談ください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。