



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Clinical Prevention Services
Provincial STI/HIV Clinic

Tel 604.707.5600
Fax 604.707.5604

655 West 12th Avenue
Vancouver, BC V5Z 4R4

www.bccdc.ca
www.SmartSexResource.com

ニトロフラントイン Nitrofurantoin

ニトロフラントイン（水和物および巨大結晶：Macrobid®）は、下部尿路感染症の治療または予防に使われる抗生物質です。

アレルギー（Allergies）

- ニトロフラントイン（Macrobid®）またはダントロレン（Dantrium®）にアレルギーまたは過敏症がある場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。
- ニトロフラントイン服用中に痒み、じんましん、重度のアレルギー反応（顔、目、手足の腫れ、口のしびれ／腫れ、胸部圧迫感、呼吸困難）が現れた場合は、ご自身の医療提供者に伝えてください。

妊娠および授乳（Pregnancy and Breastfeeding）

- ニトロフラントインは、妊娠満期（38～42週）、分娩中、および出産中は服用すべきではありません。
- 一か月未満の乳児に授乳している場合は、ニトロフラントインを服用すべきではありません。
- ニトロフラントインは、モニタリングが可能な場合を除いては、G6PD（グルコース6リン酸デヒドロゲナーゼ）欠損症と呼ばれる血液疾患をもつ幼児に使用すべきではありません。

注意（CAUTION）

- **薬物相互作用：**処方薬、市販薬、ハーブ系または嗜好用薬物を摂取している方は、ご自身の医療装提供者に伝えてください。個々の薬物相互作用については、本文書には記載しません。
- **以下の場合はご自身の医療提供者に相談してください。**
 - 腎疾患または尿の異常（排尿の量が少ないなど）がある場合。
 - 肝臓疾患がある場合、または以前にニトロフラントインを使用して肝臓に問題があった場合。
 - 肺に反応または症状（脱力感または不快感、息切れ、咳、熱、悪寒、または胸痛／圧迫感）が出た場合。
 - 手、腕、脚または足にしびれ、無感覚、または灼熱感を感じる場合。ニトロフラントインは、以下の状況がある場合、重度の末梢神経障害のリスクを増大させる可能性があります。

ニトロフラントイン (続き) Nitrofurantoin (cont'd)

- 貧血 (赤血球の数が少ない)
- 腎疾患
- 糖尿病
- 電解質不均衡
- ビタミン B 不足
- 神経損傷疾患
- ひどい下痢がある場合。

副作用 (Side Effects)

- 頭痛、めまい、または目のかすみが起こることがあります。
- 吐き気、嘔吐、胃のむかつきまたは痛み。
- 尿の色の変化 (暗色、赤茶けた黄色～茶色)

服用上の注意 (Instructions for Taking)

- ご自身の医療提供者から指示された用量を守ってください。症状が良くなっても必ず、指定された通りに服薬を完了してください。
- 胃のむかつきを避けるため、食物またはミルクと一緒に服用してください。
- 一回分を飲み忘れてしまった場合は、思い出した時にすぐその分を服用してください。ただし、次の服用時間がすぐ来る場合は、忘れた分は服用しないで次の服用時間を待ってください。2回量を一回で摂取しないでください。

保管上の注意 (Storage Instructions)

- 15～30℃の室温で保存してください。
- 光、熱、湿度を避けてください。
- 記載された有効期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

特別な指示 (Special Instructions)

- 服用開始から3日以内に症状が緩和しない、または悪化する場合は、ご自身の医療提供者に連絡してください。
- 治療が完了した後も暗色の尿、白色便、下痢 (血便を含む)、吐き気、嘔吐、食欲不振、上腹部の痛み、肌または目の黄疸、または**注意**の欄に記載されたその他の症状が継続する場合は、ご自身の医療提供者に連絡してください。

ご質問または詳しい情報をご希望の場合は、www.smartsexresource.com にアクセスするか、またはご自身の医療提供者にご連絡ください。