

ਆਤਸ਼ਕ (ਸਿਫਲਿਸ) ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ

ਪੈਨੇਸੀਲਿਨ ਜੀ ਬੈਨਜਾਬਾਈਨ (ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. - **Bicillin® L-A**)

Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਨੇਸੀਲਿਨ ਜੀ ਬੈਨਜਾਬਾਈਨ (ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. - **Bicillin® L-A**) ਸਿਫਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਛੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤੜ (ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. (Bicillin® L-A) 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. (Bicillin® L-A) 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਟੀਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਲਰਜੀਆਂ (Allergies)

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਵੀ-ਕੇ, ਐਮੋਕਸਿਲਿਨ (Amoxil® - ਐਮੋਕਸਿਲ), ਜਾਂ ਸੈਫਲੋਸਪੋਰੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਫਿਕਸੀਨ (ਸੁਪਰੈਕਸ), ਸੇਫਲੈਕਸੀਨ (ਕੀਫਲੈਕਸ), ਸੀਫੈਕਟਰ (ਸੈਕਲੋਰ) ਤੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਗਰਭਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਫਲਿਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ (CAUTION)

- ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ:** ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਹਰਬਲ, ਜਾਂ ਮਨ-ਪਰਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ (Care Following Treatment)

- ਬਿਸੀਲਿਨ- ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੱਦੜ, ਖਾਜ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ) ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।

Last reviewed by BCCDC Pharmacy on January 2022 (penicillin G benzathine)

Page 1 of 3

ਆਤਸ਼ਕ (ਸਿਫਲਿਸ) ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਨੋਸੀਲਿਨ ਜੀ ਬੈਨਜਾਬਾਈਨ (ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. - Bicillin® L-A) (ਚਲਦਾ) Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis (cont'd)

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Side Effects)

- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸੂਲੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- **ਯੈਰਿਸ਼-ਹਰਕਜ਼ਹਾਈਮਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ:** ਬੁਖਾਰ, ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ।
 - ਯੈਰਿਸ਼-ਹਰਕਜ਼ਹਾਈਮਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 - ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਲਰਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 - ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਟਾਮਿਨੋਫੇਨ (ਟਾਇਲੋਨੈਲ - Tylenol®) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ (ਐਡਵਿਲ - Advil®) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 - ਲੇਟ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਰਲੀ ਸਿਫਲਿਸ ਬਨਾਮ ਲੇਟ ਸਿਫਲਿਸ (Early Syphilis vs Late Syphilis)

ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਛਾਲੋ-ਅੱਪ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਿਫਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਟ ਸਿਫਲਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ।

- ਇਲਾਜ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
- ਸਾਥੀ ਦਾ ਛਾਲੋ-ਅੱਪ
- ਛਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਿੰਗ

ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.smartsexresource.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਨੋਸੀਲਿਨ ਜੀ ਬੈਨਜਾਥਾਈਨ (ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. - Bicillin® L-A) (ਚਲਦਾ) Penicillin G Benzathine (Bicillin® L-A) for Treatment of Syphilis (cont'd)

| | ਅਰਲੀ ਸਿਫਲਿਸ EARLY SYPHILIS | ਲੇਟ ਲੇਟੈਂਟ ਸਿਫਲਿਸ LATE LATENT SYPHILIS |
|-------------------------------------|--|---|
| ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ | <ul style="list-style-type: none"> ਗੁਪਤ ਅੰਗ/ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਪੱਧੜ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ। | <ul style="list-style-type: none"> “ਲੁਕਵੀਂ” ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਰਸੇ ਲਈ। |
| ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ | <ul style="list-style-type: none"> ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ.-Bicillin® L-A 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਛੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. (Bicillin® L-A) ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਅੰਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਪੱਧੜ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। | <ul style="list-style-type: none"> ਬਿਸੀਲਿਨ ਐਲ.ਏ. - Bicillin® L-A) 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੋ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ (7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ) ਚਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਛੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਚਿੱਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ = 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ। |
| ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਾਲੋ-ਅੱਪ | <ul style="list-style-type: none"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਿਅਰ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਛਾਲੋ-ਅੱਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। | <ul style="list-style-type: none"> ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ (ਸਿਫਲਿਸ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਤੀਂਦੇ ਛਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਿਅਰ ਨਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। |
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ | <ul style="list-style-type: none"> ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ (14 ਦਿਨ) ਤਕ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀਆਂ (ਅਤੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਖਿਕ, ਗੁਰਾ ਰਹੀਂ ਜਾਂ ਧੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗਾਟਿਵ (ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ) ਹੀ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ: <ul style="list-style-type: none"> ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। | <ul style="list-style-type: none"> ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ (14 ਦਿਨ) ਬਾਅਦ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੁੰਡਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਸਾਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। |
| ਛਾਲੋ-ਅੱਪ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ | <ul style="list-style-type: none"> ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ (ਰੀਐਕਟਿਵ) ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਫਲਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਫਲਿਸ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ (ਰੀਐਕਟਿਵ) ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। | <ul style="list-style-type: none"> ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਛੇਰੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਛਾਲੋ-ਅੱਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਲਿਸ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰੇ। ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਫਲਿਸ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ (ਰੀਐਕਟਿਵ) ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। |