

ਯੀਸਟ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ: ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ

Yeast and Fungal Infections: Internal and External Genital Treatments

ਯੀਸਟ (ਖਮੀਰ) ਅਤੇ ਫੰਗਲ (ਉੱਲੀ) ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ “ਓਵਰ-ਦਾ-ਕਾਊਂਟਰ” (ਓ.ਟੀ.ਸੀ.) ਭਾਵ ਡਾਕਟਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਗੇ, ਛਾਰਮੇਸੀ ਦੇ “ਸੈਲਫ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ” ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲੂਕੋਨੇਜ਼ਲ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ (ਓ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਸਤਿਹ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਲੂਕੋਨੇਜ਼ਲ ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ।

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ/ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: (Treatment for Internal Genital / Vaginal Symptoms)

ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ:

- ਕਲੋਟ੍ਰੀਮਾਜ਼ਲ (Canesten® - ਕੈਨਸਟੈਨ) ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮ 3, 6 ਜਾਂ 7 ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਓ ਜਾਂ
- ਮੀਕੋਨਾਜ਼ਲ (Monistat® - ਮੋਨੀਸਟੈਟ, Micatin® - ਮਿਕਾਟਿਨ) ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮ 3, 6 ਜਾਂ 7 ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਓ।

ਬਦਲਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:

- ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ: ਯੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 600 ਐਮ.ਜੀ. ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ। ਕੁੱਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਨੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ/ਯੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਪੱਫ਼, ਯੋਨੀ ਦੁਆਰ, ਪੁਰਸ਼-ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸਿਰਾ)

- ਕਲੋਟ੍ਰੀਮਾਜ਼ਲ (Canesten® - ਕੈਨਸਟੈਨ) ਜਾਂ ਮੀਕੋਨਾਜ਼ਲ (Monistat® - ਮੋਨੀਸਟੈਟ, Micatin® - ਮਿਕਾਟਿਨ) ਸਤਿਹ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਪੱਫ਼ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਐਲਰਜੀਆਂ (Allergies)

- ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜੀਸਟ ਅਤੇ ਫੁੱਗ ਲਿਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ:
ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (ਚਲਦਾ)
Yeast and Fungal Infections:
Internal and External Genital Treatments

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ (Pregnancy and Chest/Breastfeeding)

- ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਲੋਟ੍ਰੀਮਾਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੀਕੋਨਾਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ (CAUTION)

- ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ:** ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਕਿਪਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਕਿਪਸ਼ਨ, ਹਰਬਲ, ਜਾਂ ਮਨ-ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ **ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ** ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ; ਹੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੀਕੋਨਾਜ਼ਲ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (Side Effects)

- ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Storage Instructions)

- 15 ਅਤੇ 30°C ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤਧਸ਼ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦੂ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ (Special Instructions)

- ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਈਟਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੀਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਵਾਈ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਛਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੁਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ www.smartsexresource.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।