



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

이소니아지드 ISONIAZID

이소니아지드는 결핵(TB) 예방이나 치료에 사용되는 항생제입니다.

언제 복용해야 하나요? (When should I take this?)

- 식사 1시간 전 또는 2시간 후 빈속에 복용하십시오.
- 이 약은 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하시는 데 도움이 됩니다.

어떻게 복용해야 하나요? (How should I take this?)

- 이소니아지드는 규칙적으로 복용하시는 것이 매우 중요합니다.
- 의사의 지시대로 복용하십시오.

복용을 1회 잊어버리면 어떻게 해야 하나요? (What should I do if I miss a dose?)

- 복용을 잊으신 경우, 기억나시는 대로 바로 복용하십시오. 다음날 복용 시간에 거의 다 되었다면, 빠뜨린 용량을 건너뛰십시오.
- 두 배로 복용하지 마십시오.

복용 시 피해야 하는 것이 있나요? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- 알코올
- 알루미늄이나 마그네슘이 함유된 제산제. 이소니아지드 복용 후 최소 1시간 간격을 두십시오.

처방전 없이 살 수 있는(비처방) 제품을 포함하여 다른 약을 복용하고 계시면 담당 의사, 간호사, 약사에게 알려십시오.

발생할 수 있는 부작용은? (What are some possible side effects?)

- 손이나 발에 **화끈거림**, 저림, 무감각 증상이 있으시면 담당 의사에게 알려십시오.

이소니아지드(계속) ISONIAZID (cont'd)

주의 사항 (Caution): 다음 증상이 나타나면 즉시 담당 의사나 간호사에게 연락하십시오.

- 이례적인 피곤이나 허약
- 열
- 식욕 상실
- 구역(구토 욕구)
- 배탈이나 설사
- 진한 소변
- 피부 또는 눈 황변
- 발진

이 안내지에서 언급하지 않은 이례적 증상이 있으시면 담당 의사에게 알려주세요.

이소니아지드 복용에 관하여 달리 알아두어야 할 사항은? (What else do I need to know about taking Isoniazid?)

- 담당 의사가 지시한 모든 검사실 검사를 받고 담당 의사나 간호사와의 예약 진료에 모두 가시는 것이 중요합니다.
- 임신 중이거나 임신 계획이 있거나 모유 수유를 원하시면 담당 의사나 간호사에게 알려주세요.

이 약은 어디에 보관해야 하나요? (Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 햇빛으로부터 보호하십시오.
- 정제 또는 시럽 제제: 시원하고 건조한 장소에서 실온에 보관하십시오.

다른 질문이 있으면 어디로 연락하나요? (Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사, 클리닉이나 다음 보건소에 연락하십시오. _____

밴쿠버 결핵 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 결핵 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신/약국 서비스: 604-707-2580