



**BC Centre for Disease Control**  
An agency of the Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard  
TB Services Fax

604 707 2692  
604 707 2690

## 피리독신(비타민 B<sub>6</sub>) PYRIDOXINE (VITAMIN B<sub>6</sub>)

피리독신은 비타민 B<sub>6</sub>의 다른 이름입니다. 비타민 B<sub>6</sub>는 이소니아지드나 기타 결핵(TB) 약으로 발생하는 손이나 발의 무감각과 저림 증상을 예방하는 데 사용됩니다.

### 언제 복용해야 하나요?(When should I take this?)

- 이 약은 매일 같은 시간에 복용하십시오. 그러면 약 복용을 기억하시는 데 도움이 됩니다.

### 어떻게 복용해야 하나요?(How should I take this?)

- 의사의 지시대로 복용하십시오.

### 복용을 1회 잊어버리면 어떻게 해야 하나요?(What should I do if I miss a dose?)

- 복용을 잊으신 경우, 기억나는 대로 바로 복용하십시오. 그러나 다음날 복용 시간이 거의 다 되었다면 빠뜨린 용량을 건너뛰십시오.
- 두 배로 복용하실 필요는 없습니다.

### 복용 시 피해야 하는 것이 있나요?(Is there anything I should avoid when taking this?)

- 처방전 없이 살 수 있는(비처방) 제품을 포함하여 다른 약을 복용하고 계시면 담당 의사와 약사에게 알려십시오.

### 발생할 수 있는 부작용은?(What are some possible side effects?)

- 비타민 B<sub>6</sub> 복용 후에도 손이나 발에 지속적인 무감각 또는 저림 증상이 있으시면, 담당 의사나 간호사에게 알려십시오.
- 햇빛에 민감하거나 피부 및/또는 근육의 움직임에 변화가 있으시면 담당 의사나 약사에게 알려십시오.

이 자료에 언급되지 않은 평소와 다른 증상이 나타나면 담당 의사에게 알려십시오.

### 이 약은 어디에 보관해야 하나요?(Where should I store this medication?)

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 시원하고 건조한 장소에서 실온에 보관하십시오.
- 햇빛으로부터 보호하십시오.

### 다른 질문이 있으면 어디로 연락하나요?(Where do I call if I have any other questions?)

담당 의사, 클리닉이나 다음 보건소에 연락하십시오: \_\_\_\_\_

밴쿠버 결핵 서비스 클리닉: 604-707-2692

뉴웨스트민스터 결핵 서비스 클리닉: 604-707-2698

BCCDC 백신/약국 서비스: 604-707-2580